

お得意様各位

**「効能又は効果」及び「用法及び用量」
追加のお知らせ**

2014年12月

摩耶堂製薬株式会社

アレルギー性疾患治療剤

日本薬局方 オロパタジン塩酸塩錠

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「マヤ」
オロパタジン塩酸塩錠5mg「マヤ」

Olopatadine Hydrochloride Tablets 2.5mg

Olopatadine Hydrochloride Tablets 5mg

このたび、オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg「マヤ」/5mg「マヤ」につきまして、「効能・効果」「用法・用量」の一部変更承認を取得いたしましたので、ご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

記

改訂内容（下線 部追加改訂）

改訂後	改訂前
<p>【用法・用量】 <u>成人</u>:通常、成人には1回オロパタジン塩酸塩として5mgを朝及び就寝前の1日2回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 <u>小児</u>:通常、7歳以上の小児には1回オロパタジン塩酸塩として5mgを朝及び就寝前の1日2回経口投与する。</p> <p>【効能・効果】 <u>成人</u>:アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症、尋常性乾癬、多形滲出性紅斑） <u>小児</u>:アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒</p>	<p>【用法・用量】 通常、成人には1回オロパタジン塩酸塩として5mgを朝及び就寝前の1日2回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。</p> <p>【効能・効果】 <u>成人</u>:アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症、尋常性乾癬、多形滲出性紅斑）</p>

改訂後の添付文書につきましては、弊社ホームページ(<http://www.mayado.jp/>)及び医薬品医療機器情報提供ホームページ (<http://www.info.pmda.go.jp/>) に掲載いたします。

以上

お問合せ先

摩耶堂製薬株式会社 医薬部
〒651-2142 神戸市西区二ツ屋 1-2-15
TEL 078-929-0066 FAX 078-929-1180