

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

いぼ痔・きれ痔も 摩耶字散

M A Y A J I S A N

生薬製剤
第2類医薬品
販売名:
摩耶字散(マヤジサン)

16種類の生薬が 痛みや出血など痔の症状に バランスよく効きます。

摩耶字散は、痔による炎症や痛みを抑え、
肛門まわりの筋肉や痙攣(けいれん)を和らげます。
また、患部の血液循環が良くなり、痔の症状の改善に効果的です。
携帯に便利なアルミ分包包装です。

4つの作用

ショウマ
シャクヤク
ポウフウ
など

痛みを
鎮める

出血を
おさえる


ボタンピ
オウゴン
ダイオウ
など

トウキ
トウニン
ボタンピ
など

血流を
改善する

便を
柔らかげる

トウキ
トウニン



服用 ポイント

温かいお湯で服用いただくと、
より効果的かつ服用しやすくなります。

養生 ポイント

便秘にならないよう、バランスの良い食事を心がけましょう。
温かい飲み物を摂るなど、体を冷やさないようにしましょう。
疲れやストレスを溜めないようにしましょう。



※製剤の特性から触感的に固まっているように感じられますが、分包品を振ることにより内容物が固まっていないことを確認できます。

※本剤を服用する際、口中の水分により口の中で固まったように感じるがありますが、効果に変わりはありませんのでそのまま服用ください。

和漢のチカラを科学し、あなたへ。～摩耶堂製薬～

漢方薬に日本の生薬「和薬」等を配合したものを「和漢薬」といい、日本人の体質に合わせて心身の不調をお手当てすることを目指しています。『摩耶堂製薬』のお薬は、和漢薬にさらに独自の工夫を加え、カラダの内側から効き目を現す処方です。現代社会がもたらす様々な心身の不調を整え、あなたの本来の健やかさを。摩耶堂製薬の想いです。



使用上の注意



してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人、胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 次の症状のある人: 食欲不振、吐き気・嘔吐、軟便、下痢 (7) 次の診断を受けた人: 高血圧 (8) 次の医薬品を服用している人: 瀉下薬 (下剤)
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐、 げばしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

次の場合の症状の緩和：痔核（いぼ痔）、きれ痔、痔出血

【用法・用量】

次の量を食間に水又はお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成 人	1包	3回
8歳～15歳	1/2包	
4歳～7歳	1/3包	
4歳未満	服用しないこと	

服用時間を守りましょう。

食間：食後2～3時間後の空腹時を指します。

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

1包 1.5g・20包中に次の生薬より製したエキスを含有しています。

サイコ……8.0g	トウキ……12.0g	タイソウ……5.0g	ブクリョウ……7.0g
ショウマ……6.0g	ダイオウ……7.0g	シャクヤク……7.0g	ニンジン……5.0g
カンゾウ……5.0g	ハンゲ……5.0g	オウギ……6.0g	ボタンビ……5.0g
オウゴン……7.0g	ショウキョウ……3.0g	トウニン……6.0g	ボウフウ……6.0g

※添加物としてカルメロースCa、無水ケイ酸を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【その他】

本剤は生薬を用いた製品ですから、製品により色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

お問い合わせ先：「くすりの相談室」電話：(078)929-0112

受付時間：9:00～17:30(土、日、祝日、弊社休日を除く)

製造販売元 ロート製薬グループ



摩耶堂製薬株式会社

神戸市西区玉津町居住65-1
https://www.mayado.jp

