

煎薬

摩耶肝臓湯

第2類医薬品

☆摩耶肝臓湯は、肝障害改善作用、抗炎症作用などの働きのある生薬から構成された肝臓疾患薬で、胆石、黄疸に効果があります。また、肝臓を保護するとともに、肝機能低下に伴う症状にも有効です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

- *1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 高齢者
 - (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (7) 次の症状のある人
 - 軟便、下痢、むくみ
 - (8) 次の診断を受けた人
 - 高血圧、心臓病、腎臓病
 - (9) 次の医薬品を服用している人
 - 瀉下薬(下剤)
- *2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- *3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 軟便、下痢
- *4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- *5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

胆石、黄疸、肝臓疾患

用法・用量

成人 1日 1袋に水約600mlを入れて1/2量に煎じ詰め、1日 3回食前或は食間に温服してください。

8歳～15歳は成人の1/2量宛、5歳～7歳は成人の1/3量宛服用してください。

服用時間を守りましょう。

食前：食事の30分～1時間前の空腹時を指します。

食間：食後2～3時間後の空腹時を指します。

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

1袋(成人 1日量)中に次の生薬を31.5g含有しています。

成分	分量	成分	分量
サイコ	4.0g	タイソウ	2.0g
ハンゲ	3.0g	ダイオウ	2.0g
ショウキョウ	3.0g	キジツ	2.0g
ケイヒ	2.0g	インチンコウ	2.0g
オウゴン	3.0g	サンシシ	3.0g
シャクヤク	4.0g	カンゾウ	1.5g

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)箱の「開封年月日」記入欄に、チャック付袋を開封した日付を記入してください。
- (5)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。




煎じ方のポイント (生薬が袋の中に入っています。袋のまま使用します。)

●煎出容器

煎じる容器はドビン、セトモノ、耐熱ガラス製、アルマイト製、ステンレス製のものを使用してください。ただし、鉄製の容器を使うと化学反応を起こし、薬効を減少させることがありますので使用しないでください。

●煎剤の作り方

容器に約600mlの水と1袋を入れて火にかけ、とろ火で沸騰させます。沸騰したら蓋を取り、吹きこぼれないように弱火に調節して30～40分間煎じ、約1/2量に煮詰めてください。できた薬液から袋を取り出したものが1日分です。その薬液を3回に分けて服用してください。



●注意

煎剤は、1日分(1袋)ずつを煎じてください。煎じた薬液は変質しやすいので冷蔵庫に保存し、煎じたその日のうちに服用してしまうのが原則です。そして服用時には、1回に服用する分だけを温め直してから服用してください。

お問い合わせ先

本製品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡お願い申し上げます。

摩耶堂製薬株式会社 「くすりの相談室」

〒651-2142 神戸市西区二ツ屋1-2-15 電話 (078)929-0112

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)



製造販売元

摩耶堂製薬株式会社

神戸市西区玉津町居住65-1