



和漢薬本来の効き目をあなたに
摩耶堂の浸煎薬

ネオ糖解湯

【効能・効果】糖尿病
茶剤・1袋

10種の生薬からなる
日本生まれの和漢処方
口渇、頻尿で
血糖値が高めの方に

【成分・分量】1袋(成人1日量)中に次の生薬を20.0g含有しています。

バクモンドウ	2.4g	カロコン	2.4g
ニンジン	1.6g	ブクリョウ	2.4g
カクコン	2.4g	ゴシシ	1.2g
ジオウ	2.4g	カンゾウ	1.2g
チモ	2.0g	タラ根	2.0g

第2類医薬品

HR246A-03

この説明書きは本剤と
ともに保管し、服用の際
にはよくお読みください。

茶剤 ネオ糖解湯

生薬製剤
第2類医薬品
20.0g×1袋

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)胃腸の弱い人(4)高齢者(5)次の症状のある人:むくみ、食欲不振、吐き気、嘔吐(6)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐
その他	興奮、不眠、高血圧

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】糖尿病

【用法・用量】○通常成人1袋に水約600mlを加え約1/2量に煎じ詰め、1回約100ml・1日3回・食前又は食間に分けて服用してください。○通常成人1袋を3回・熱湯約150ml中にて振り出し、1日3回・食前又は食間に分けて服用してください。○小児(8歳~15歳)は成人の1/2量服用してください。

<用法・用量に関連する注意>(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり品質が変わることがあります。)(4)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



4

製造販売元

ロート製薬グループ



摩耶堂製薬株式会社
神戸市西区玉津町居住65-1

お問合せ先：「くすりの相談室」電話(078)929-0112

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931



使用期限
製造番号

HR246B-03