

生薬エキス散

清風散

第②類医薬品

☆清風散は、熱を下げ、咳をとめ、痰を切れやすくするなどの作用のある生薬を中心に配合した製剤で、かぜの諸症状に効果的なかぜ薬です。

また、生薬製剤で、眠くなる成分は入っていない為、仕事中等の時にも服用していただけます。

☆服用しやすい散剤で、携帯に便利なアルミ分包包装です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬
- *2. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください。



相談すること

- *1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (8) 次の症状のある人
高熱、むくみ、食欲不振、吐き気・嘔吐、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、腎臓病



- *2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐
精神神経系	不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力感、精神興奮
泌 尿 器	排尿障害

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上がったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- *3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

●感冒、感冒に因づく次の諸症：

咳、熱、頭痛、頭重、悪寒、さむけ、たん

用法・用量

次の量を、食前又は食間に、水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人	1包	3～5回
8歳～15歳	1/2包	
4歳～7歳	1/3包	
4歳未満	服用しないこと	

服用時間を守りましょう。

食前：食事の30分～1時間前の空腹時を指します。

食間：食後2～3時間後の空腹時を指します。

<用法・用量に関連する注意>


(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

服用方法



①最初に口の中に少しの水やぬるま湯をふくんでください。



②アルミをやぶつて、薬を口の中に入れてください。



③水やぬるま湯を口に入れて、薬と一緒にのみほします。



④もう一度、水やぬるま湯で口の中をゆすぐようにします。

成分・分量

1包1.5g・20包中に次の生薬より製したエキス30.0g含有しています。

成分	分量	成分	分量
カッコン	16.0g	ハンゲ	7.0g
マオウ	14.0g	サイコ	9.0g
タイソウ	10.0g	キキョウ	7.0g
ショウキョウ	6.0g	キョウニン	6.0g
シャクヤク	7.0g	オウゴン	7.0g
ケイヒ	6.0g	カンゾウ	5.0g

添加物としてカルメロースCa、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



その他

本剤は生薬を用いた製品ですから、製品により色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

お問い合わせ先

本製品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡お願い申し上げます。

摩耶堂製薬株式会社 「くすりの相談室」

〒651-2142 神戸市西区二ツ屋1-2-15 電話 (078)929-0112

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)



製造販売元

摩耶堂製薬株式会社

神戸市西区玉津町居住65-1